


PROVINCIA DI RAVENNA - ASSESSORATO AGRICOLTURA
BOLLETTINO TECNICO AGROMETEOROLOGICO E DI PRODUZIONE INTEGRATA
a cura del
COMITATO PROVINCIALE per il COORDINAMENTO dei SERVIZI

BOLLETTINO TECNICO N. 6 del 24 MARZO 2010

PREVISIONI METEO si prevedono condizioni di tempo variabile. Temperature senza variazioni di rilievo.

Riportiamo l'aggiornamento della situazione della profondità di falda in tre località della provincia di Ravenna in base ai rilievi effettuati la scorsa settimana.



Dopo i valori molto elevati della falda rilevati ad inizio marzo si è registrato un assestamento per le stazioni di Alfonsine e Lugo, mentre la stazione di Santerno prosegue la risalita, ma è comunque posizionata su valori più rassicuranti.

Si ritiene che con il rallentamento delle precipitazioni e l'aumento dell'evaporazione conseguente all'avanzamento della stagione i valori di falda si riportino su livelli più normali, lasciando un adeguato spazio vitale per l'apparato radicale delle colture.

N.B. E' possibile consultare i dati regionali di falda aggiornati ai seguenti indirizzi web:

ALBICOCCO: fioritura.

MONILIA: si consiglia di intervenire ad inizio fioritura con **tebuconazolo** (formulati al 4,4%, 430 ml/hl) **max 2 tratt./anno indipendentemente dalle avversità**, oppure **fenbuconazolo** (INDAR 5EW o SIMITAR, 70 ml/hl) **max 3 tratt./anno indipendentemente dalle avversità, max 4 nelle aziende con gravi attacchi di apiognomonìa nell'anno precedente**, oppure **fludioxonil+ciprodinil** (SWITCH, 30 g/hl) **max 2 tratt./anno indipendentemente dalle avversità**; oppure **pyraclostrobin+boscalid** (SIGNUM, 60-75 g/hl) **max 2 tratt./anno indipendentemente dalle avversità**; in generale sulla coltura non si possono eseguire più di **3 interventi all'anno contro questa avversità**.

SUSINO: cv. Cino giapponesi: mazzetti divaricati bottone bianco; cv europee: gemma rotta.

MONILIA: sulle cv. ad alta sensibilità ad es. Angeleno si consiglia di intervenire in pre-fioritura con **fenbuconazolo** (INDAR 5EW o SIMITAR, 70 g/hl) **max 3 tratt./anno** indipendentemente dalle avversità, oppure **fludioxinil + ciprodinil** (SWITCH, 30 g/hl) **max 2 tratt./anno** indipendentemente dalle avversità, oppure **pyraclostrobyn + boscalid** (SIGNUM, 60-75 g/hl) **max 2 tratt./anno** indipendentemente dalle avversità. **Sulla coltura non si possono eseguire più di 4 interventi all'anno contro questa avversità.**

TENTREDINI: si consiglia di installare, nella fase di inizio bottone bianco, le trappole cromotropiche per la cattura degli adulti.

EULIA: si consiglia di installare le trappole in modo particolare nelle aziende con danni riscontrati nell'anno precedente.

COCCINIGLIE: in caso di presenza di cocciniglie vive sulle piante o di danni riscontrati alla raccolta nello scorso anno intervenire **nella fase di rottura gemme (cv. europee)** con **olio bianco** (2,5-3 l/hl) oppure, nella fase di prefioritura con **buprofezin** (APPLAUD 40 SC, 80 ml/hl).

Attenzione il p.a. buprofezin non si può impiegare dopo il 30 marzo 2010.

PESCO: bottone rosa-inizio fioritura.

MONILIA: **max 4 tratt./anno contro questa avversità.** Si consiglia di intervenire **solo su cultivar molto suscettibili**, in previsione di piogge o con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia (nebbie e bagnature persistenti) impiegando **fludioxinil + ciprodinil** (SWITCH, 30 g/hl) **max 2 tratt./anno** indipendentemente dalle avversità, oppure **pyraclostrobyn + boscalid** (SIGNUM, 60-75 g/hl) **max 2 tratt./anno** indipendentemente dalle avversità, oppure **tebuconazolo** (formulati al 4,4%, 430 ml/hl), **max 2 tratt./anno** indipendentemente dall'avversità o **fenbuconazolo** (INDAR 5EW o SIMITAR, 70 ml/hl) **max 4 tratt./anno**, indipendentemente dall'avversità o **difenconazolo** (SCORE 25 EC, 25 ml/hl) **max 4 tratt./anno**, indipendentemente dall'avversità. Tebuconazolo, difenconazolo e fenbuconazolo sono di uso alternativo.

SHARKA: i sintomi si possono riscontrare nei petali dove la malattia provoca delle rotture di colore e delle screziature. Si consiglia di **controllare i pescheti durante la fioritura** (i sintomi sono visibili sulle cultivar a fiore rosaceo) e, in caso di presenza, contattare il Servizio Fitosanitario Regionale.

CYDIA MOLESTA: il modello previsionale prevede l'inizio del volo ai primi di aprile: si consiglia pertanto di installare le trappole per monitorare il volo.

AFIDI: intervenire al superamento della soglia del 3% di germogli occupati, nella fase di bottone rosa, impiegando **flonicamid** (TEPPEKI, 140 g/ha) **max 1 tratt./anno.**

TRIPIDI: intervenire in caso di presenza o con danni di nell'anno precedente utilizzando **lambdacialotrina** (KARATE ZEON, 20 g/hl) oppure **bifentrin** (BRIGATA FLO, 150 ml/hl) oppure **ciflutrin** (formulati al 5%, 50 ml/hl) oppure **cipermetrina** (CIPERTHRIN PLUS, 75 ml/hl) oppure **deltametrina** (formulati al 1,63%, 80 ml/hl). Tra tutti questi piretroidi **max 1 tratt./anno** e **solo in pre-fioritura** e in alternativa ad acrintrina; oppure **acrintrina** (RUFAS E-flo, 80 ml/hl), **max 1 tratt./anno** e in alternativa agli altri piretroidi ed impiegabile in pre o in post fioritura; acrintrina: **max 2 tratt./anno** tra tripide e cydia di cui 1 in pre o post fioritura e 1 in estate.

PERO: mazzetti affioranti.

TICCHIOLATURA: intervenire, in previsione di pioggia o entro **24 ore** dopo l'inizio della stessa, con **mancozeb** (formulati al 80%, 200 g/hl) o **metiram** (POLYRAM DF, 200 g/hl) oppure **dithianon** (formulati al 70%, 80 g/hl). Oppure **poltiglia bordolese** (formulati al 20%, 500 g/hl) oppure **ossicloruro di rame** (formulati al 35%, 300 g/hl), attivi anche contro cancri rameali e batteriosi.

COCCINIGLIA: dove non sono stati eseguiti interventi nella fase di ingrossamento gemme è ancora possibile intervenire nella fase di punte verdi impiegando **polisolfuro di calcio** 20-22 kg in 84-82 litri d'acqua (attivo anche nei confronti di ticchiolatura e cancri rameali) oppure con **olio bianco** 2,5-3 l/hl oppure **piriproxyfen** (JUVINAL, 320 ml/ha) **max 1 tratt/anno**. Si consiglia di aggiungere un bagnante.

EULIA: si consiglia di installare le trappole.

MELO: da punte verdi a orecchiette di topo.

TICCHIOLATURA: intervenire, in previsione di pioggia o entro **24 ore** dopo l'inizio della stessa, con **dithianon** (formulati al 70%, 100 g/hl) oppure con **poltiglia bordolese** (formulati al 20%, 600-800 g/hl) oppure **ossicloruro di rame** (formulati al 35%, 400 g/hl) prodotti attivi anche nei confronti dei cancri rameali e da riservare per le varietà a punte verdi.

COCCINIGLIA: intervenire da punte verdi a orecchiette di topo impiegando **polisolfuro di calcio** 20-22 kg in 84-82 litri d'acqua (attivo anche nei confronti di ticchiolatura e cancri rameali) oppure con **olio bianco** 2,5- 3 l/hl (attivo anche nei confronti delle uova di ragnetto rosso) oppure **piriproxyfen** (JUVINAL, 320 ml/ha) **max 1 tratt/anno**. Si consiglia di aggiungere un bagnante.

EULIA: si consiglia di installare le trappole.

KAKI: ingrossamento gemme.

COCCINIGLIE: (*Ceroplastes rusci*) Intervenire in caso di presenza diffusa, impiegando **olio bianco** 2,5-3 l/hl. Fare attenzione che il prodotto utilizzato sia registrato sulla coltura.

DISERBO FRUTTIFERI E VITE

Intervenire nelle prime fasi di sviluppo delle infestanti con **glifosate** (30,4% di p.a.) 1,5-3 l/ha o **glufosinate ammonio** 4-6 l/ha (consigliato negli impianti più giovani). Considerare le dosi massime consentite per anno pari a 7,5 l/ha per con **glifosate** e 18 l/ha per **glufosinate ammonio**.

Limitatamente alla vite, come erbicida residuale è possibile utilizzare **flazasulfuron** (CHIKARA 25 WG) alla dose di 60 g/ha escludendo i terreni sabbiosi (il suo impiego è consentito solo ad anni alterni). Limitatamente ai primi due anni di impianto è possibile utilizzare anche **pendimetalin** (STOMP AQUA) alla dose di 2 l/ha.

FRUMENTO TENERO E DURO: accestimento.

SEPTORIA: i rilievi effettuati nell'areale orientale della provincia hanno già evidenziato la presenza di *Septoria* sia su frumento tenero sia su duro.

In considerazione delle condizioni favorevoli allo sviluppo del patogeno è bene monitorare attentamente i seminativi, in particolare quelli seminati precocemente.

In caso di presenza intervenire con **azoxystrobin** (AMISTAR 0,6-0,8 l/ha) oppure **propiconazolo** (formulati a 25 g/l 0,5 l/ha) oppure **ciproconazolo + procloraz** solo formulati NC o Xi (formulati con 2,15+16,15 2-2,5 l/ha).

Diserbo

Infestanti graminacee:

Per avena, coda di volpe e loietto **pinoxaden + clodinafop-propargile + antidoto** (TRAXOS) 0,250 l/ha attivato con il bagnante specifico ADIGOR (2l/ha)

Per avena e loietto **pinoxaden + antidoto** (AXIAL) 0,450 l/ha attivato con il bagnante specifico ADIGOR (1,5 l/ha)

Per avena e coda di volpe **clodinafop-propargile + antidoto** (TOPIK 240 EC 0,2-0,250 l/ha o Topik 80 EC 0,6-0,750 l/ha) oppure **fenoxaprop-p-ethyl + antidoto** (GRALIT MAX- PROPER ENERGY-STRAPROP) 1-1,2 l/ha.

Infestanti graminacee e alcune dicotiledoni (crucifere, composite): mesosulfuron-metile + iodossulfuron metile (ATLANTIS WG) 0,5 kg/ha + BIOPOWER 1 l/ha. **N.B.: non utilizzare sulla varietà MIETI.**

Infestanti dicotiledoni:

Per infestanti comuni **tribenuron metile**(GRANSTAR 50 SX 0,015-0,022 kg/ha o **triasulfuron** (LOGRAN) 0,037 kg/ha o **metsulfuron-metile** (formulati al 20%) 0,015-0,020 kg/ha o **florasulam** (AZIMUT) 0,100-0,125 l/ha.

Per dicotiledoni comuni e *Galium florasulam* (AZIMUT) 0,100-0,125 l/ha oppure una delle solfoniluree sopra elencate addizionate di **amidosulfuron** (LEGION) 0,030 kg/ o fluroxipir + florasulam (MANTA DUO, KICKER, STARANE GOLD) 1-1,2 l/ha oppure **tribenuron-metile + MCPP-P** (GRANSTAR POWER SX) 1.090 g/ha.

Con infestazioni miste (compreso Galium) fluroxypyr + clopiralid + mcpa sale (ARIANE II alla dose di 3,5-4 l/ha) o estere (ARIANE GOLD alla dose di 2,5-3 l/ha).

Infestanti graminacee e dicotiledoni (compreso Galium): iodossulfuron + fenoxaprop-p-ethyl + mefenpiridietile (PUMA GOLD) 1,25 l/ha + bagnante BIOPOWER 1 l/ha oppure **mesossulfuron-metile + iodossulfuron metile** (HUSSAR MAX) 0,300 g/ha + BIOPOWER 1 l/ha.

Fertilizzazione

Azoto: per calcolare il quantitativo di azoto da distribuire occorre adottare il metodo del bilancio. Le precipitazioni dal 1/10/2009 al 31/01/2010 sono risultate superiori a 250 mm e quindi è ammesso anticipare, a partire dall'accestimento, una quota di azoto pari all'equivalente dell'azoto pronto riservando la dose principale alla fase di spiga a 1 centimetro.

Se la quantità di azoto che si deve distribuire supera i **100 Kg/ha** questa dovrà essere frazionata, 70% alla spiga di 1 cm. ed il rimanente nella fase di levata entro l'emissione dell'ultima foglia. I concimi a lenta cessione possono essere distribuiti in un'unica soluzione.

Nelle aree preferenziali a prevalente tutela idrologica e quelle "vulnerabili" non è ammesso superare i **170 kg/ha di N** per anno proveniente da sostanza organica.

Fosforo e Potassio: non sono ammesse concimazioni di copertura.

ORZO: accestimento

Infestanti graminacee:

per avena e per loietto **diclofop metile** (ILLOXAN) 2-2,5 l/ha.

Per avena, loietto e coda di volpe **pinoxaden + antidoto** (AXIAL) 0,450 l/ha attivato con il bagnante specifico ADIGOR (1,5 l/ha)

Per avena e coda di volpe **fenoxaprop-p-ethyl + antidoto** (STRAPROP) 0,8-1 l/ha.

Infestanti dicotiledoni:

Per dicotiledoni comuni e *Galium florasulam* (AZIMUT) 0,100-0,125 l/ha oppure una delle solfoniluree sopra elencate addizionate di **amidosulfuron** (LEGION) 0,030 kg/ o fluroxipir + florasulam (MANTA DUO, KICKER, STARANE GOLD) 1-1,2 l/ha oppure **tribenuron-metile + MCPP-P** (GRANSTAR POWER SX) 1.090 g/ha.

Con infestazioni miste (compreso Galium) fluroxypyr + clopiralid + mcpa sale (ARIANE II alla dose di 3,5-4 l/ha) o estere (ARIANE GOLD alla dose di 2,5-3 l/ha).

N.B.: Fare molta attenzione ai cereali seminati su sodo dopo erba medica. In caso di elevata presenza di Avena evitare miscele di Axial con Granstar Power SX.

GIRASOLE

Diserbo di pre-semina

In caso di infestanti emerse è possibile utilizzare glifosate (formulati al 30,4% di p.a.) alla dose di 1,5-3 l/ha (attenzione alle registrazioni sulla coltura) o glufosinate ammonio (BASTA) alla dose di 4-7 l/ha.

Diserbo di pre-emergenza

Intervenire con pendimetalin (formulati al 31,7% alla dose di 2-2,5 l/ha oppure STOMP AQUA alla dose di 1,5-1,7 l/ha) + aclonifen (CHALLENGE alla dose di 1-1,5 l/ha). Per allargare lo spettro d'azione all' *Ammi majus* aggiungere oxifluorfen (formulati a 240 g/l 0,4-0,5 l/ha o formulati a 480 g/l 0,2-0,25 l/ha).

MAIS

Diserbo di pre-semina.

In caso di infestanti emerse è possibile utilizzare **glifosate** (formulati al 30,4% di p.a.) alla dose di 1,5-3 l/ha o **glufosinate ammonio** (BASTA) alla dose di 4-7 l/ha.

Diserbo di pre-emergenza.

Graminacee e dicotiledoni annuali:

Miscele formulate:

S-metolaclor + terbutilazina (PRIMAGRAM GOLD) 4 l/ha.

Acetoclor (450 g/l) + terbutilazina (214 g/l) (TROPHY GOLD) 3,5-3,9 l/ha

Acetoclor (450 g/l) + terbutilazina (214 g/l) (SENATOR, ERBIFEN 04) 3,5-4 l/ha

Acetoclor (333 g/l) + terbutilazina (166,5 g/l) (ACETOCLICK, ERBIFEN CLASS) 4-5 l/ha

Dimetenamide-P + terbutilazina (AKRIS) 2-3 l/ha

Petoxamide + terbutilazina (SUCCESSOR T) 3 l/ha

Miscele estemporanee con terbutilazina:

S-metolaclor (DUAL GOLD, ANTIGRAM GOLD, ERBIFOS GOLD 1-1,4 l/ha

Acetoclor (TROPHY 40 CS) 4-5 l/ha

Acetoclor (BOLERO) 1,5-2 l/ha

Dimetenamide-P (SPECTRUM) 1-1,3 l/ha

Petoxamide (SUCCESSOR 600) 2 l/ha

tutti addizionati di terbutilazina + pendimetalin (TREK P 2,5-3 l/ha o TROLER TOP 3-5 l/ha)

Miscele estemporanee senza terbutilazina:

S-metolaclor (DUAL GOLD, ANTIGRAM GOLD, ERBIFOS GOLD 1-1,4 l/ha

Acetoclor (TROPHY 40 CS) 4-5 l/ha

Acetoclor (BOLERO) 1,5-2 l/ha

Dimetenamide-P (SPECTRUM) 1-1,3 l/ha

Petoxamide (SUCCESSOR 600) 2 l/ha

tutti addizionate di **pendimetalin** (formulati al 31,7% alla dose di 2-3 l/ha) e/o **aclonifen** (CHALLENGE alla dose di 1,5-2 l/ha).

Con presenza di *Abutilon theophrasti*:

E' possibile utilizzare tutte le miscele sopra elencate con addizione di **isoxaflutolo** (MERLIN EXPERT alla dose di 1,2- 1,4 l/ha) o **clomazone** (COMMAND 36 CS alla dose di 0,250-0,3 l/ha) oppure impiegare la miscela già formulata di **S-metolaclor + terbutilazina + mesotrione** (LUMAX alla dose di 4 l/ha. I soli graminicidi residuali possono essere utilizzati in miscela anche con **pendimetalin + sulcotrione** (SULCOTREK 2-2,5 l/ha).

Con infestanti nate dopo la semina ma prima dell'emergenza del mais si può aggiungere **glufosinate ammonio** (4-7 l/ha) oppure glifosate (attenzione ai formulati autorizzati in tale epoca) alla dose di 1,5-3 l/ha entro 72 ore dalla semina.

N.B. Il diserbo di pre-emergenza può essere localizzato sulla fila, ricordando che l'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie. E' possibile inoltre trattare a pieno campo solo sul 50% della superficie destinata a mais ed effettuare trattamenti solo in post-emergenza sul restante 50%.

ELATERIDI: Al superamento della soglia (presenza accertata attraverso vasi trappola e/o carotaggi) è possibile localizzare alla semina **bifentrin (BRIGATA GEO, 10-15 kg/ha)** oppure **teflutrin (FORCE, 10-12 kg/ha)**. Ad esclusione dei terreni in cui il mais segue l'erba medica, la geodisinfestazione non può essere applicata su più del 10% della superficie.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: pre-semina.

ELATERIDI: si consiglia di effettuare controlli per verificare la presenza delle larve mediante carotaggi. Se si supera la soglia pari a 15 larve/m², intervenire mediante trattamenti localizzati alla semina con. E' ammesso l'impiego della concia con **imidacloprid o teflutrin o thiametoxan o clothianidin**.

ELATERIDI, ALTICA, ATOMARIA: interventi localizzati alla semina con **teflutrin (FORCE, 12-15 kg/ha)** o **bifentrin (BRIGATA GEO, 10-15 kg/ha)**; **in alternativa** è possibile impiegare seme conciato con **imidacloprid (GAUCHO)** o **imidacloprid + teflutrin (GAUCHO MONTOUR)** o **thiametoxan (CRUISER)**.

Diserbo di pre-semina

In presenza di infestanti emerse, sono autorizzati i diserbanti a base di **glifosate** (formulati al 30,4%) 1,5-3 l/ha oppure **glufosinate ammonio** 4-7 l/ha (quest'ultimo a volte non perfettamente efficace a basse temperature)

Diserbo di pre-emergenza

Impiegare **cloridazon** (2 kg/ha di formulati al 65%) se prevalgono crucifere e poligono convolvolo, oppure **metamitron** (2 kg/ha di formulati al 70%) se prevalgono correggiola e amaranto oppure **lenacil** (0,25 kg/ha di formulati all'80%) ed etofumesate (1 l/ha di formulati a 44,64%) se prevalgono *Galium*, mercuriale, anagallide, erba strega (*Stachys annua*). **Migliori risultati si ottengono miscelando i prodotti citati non superando però i 3 l o kg/ha di formulato (in relazione alle % di p. a. del formulato utilizzato)**. Fermo restando i 3 kg/ha si possono effettuare i trattamenti in localizzazione alla semina o a pieno campo. In quest'ultimo caso, con infestanti nate dopo la semina ma prima dell'emergenza della bietola si può aggiungere **glufosinate ammonio** (4-7 l/ha) oppure **glifosate** (attenzione ai formulati autorizzati in tale epoca) alla dose di 1,5-3 l/ha entro 72 ore dalla semina.

Fertilizzazione

Azoto: per calcolare il quantitativo di azoto da distribuire occorre adottare il metodo del bilancio.

Gli apporti vanno eseguiti dalla fase di semina ed entro lo stadio di 8 foglie vere.

La piovosità sul territorio provinciale da ottobre a gennaio risulta superiore alle medie storiche, quindi è consentito somministrare una quota di azoto in immediata presemina (massimo 15 giorni), limitatamente ad una quota non superiore al 60% della dose da bilancio e comunque non superiore ai 45 kg/ha.

Fosforo:

Dotazione elevata: distribuzione solo localizzata alla semina (**max 50 kg/ha**).

Dotazione normale: calcolare la dose di mantenimento in base alle asportazioni previste. Apporto **max 150 kg/ha**.

Dotazione insufficiente: in questi casi è necessario prevedere un arricchimento oltre al mantenimento. In base al calcolo delle asportazioni si possono distribuire fino ad un **max di 250 kg/ha**.

Potassio: il potassio va totalmente distribuito alla preparazione del terreno.

Dotazione elevata: non sono ammessi interventi.

Dotazione normale: distribuito alla preparazione del terreno in base alle asportazioni previste (**max 200 kg/ha**).

Dotazione insufficiente: distribuire alla preparazione del terreno la quantità necessaria per portare la disponibilità al livello di sufficienza fino ad un **max di 300 kg/ha**.

SCelta VARIETALE: Per gli estirpi precoci è ammesso l'utilizzo di varietà resistenti ai nematodi per le aziende che abbiano accertato, presso laboratori accreditati, una presenza di 100-400 uova-larve vive per 100 grammi di terreno.

Per gli **estirpi precoci** (I modulo) ammesso anche l'utilizzo di varietà non tolleranti.

Per gli **estirpi del II e III** modulo ammesse solo cultivar con tolleranza alla cercospora medio-scarso, media e medio-buona.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - CLASSI DI TOLLERANZA ALLA CERCOSPORA

VARIETA' PER LE SEMINE PRIMAVERILI 2010 IN ORDINE DECRESCENTE DI TOLLERANZA

NOME VARIETA'	CASA SEMENTIERA	TOLLERANZA
CONCERTO	Betaseed	MEDIO-BUONA
FLAVIA	Kws	
LUCREZIA KWS	Kws	
DOROTEA	Hilleshog	MEDIA
LEILA	Kws	
FABRIZIA KWS	Kws	
OREGON	Betaseed	
ERADICA	Hilleshog	
MONTANA	Betaseed	
TIZIANA	Hilleshog	
NEW YORK	Betaseed	
NOVIS	SesVanderhave	
DORIANA	Hilleshog	
RUVETA	Hilleshog	
RITOP	SesVanderhave	
LIANA	Kws	
HELITA	Hilleshog	
ANTINEA KWS	Kws	
VINCENT	Strube	
ESPERANZA	Kws (Spagna)	
LENNOX	Strube	
NINFEA	SesVanderhave	
VENERE	SesVanderhave	
OSMA	SesVanderhave (Spagna)	
BERING	Strube	
BRUNA KWS	Kws	

A 147	Hilleshog	
DIAMENTA	Hilleshog	
MARYLAND	Betaseed	
RIMA	SesVanderhave	
PIERA	Kws	SCARSA
RICER	SesVanderhave	
PAULETTA	Kws	
RIZOR	SesVanderhave	
HOUSTON	Betaseed	
MASSIMA	Kws	
IMPALA	Betaseed	
ARIETE	SesVanderhave	
FLORIDA	Betaseed	NULLA
ALEZAN	Strube	
GENIO	Strube	
DUETTO	SesVanderhave	
ELVIS	Strube	
NESTORIX	SesVanderhave	
FERNANDO	Strube	
RICROS	Aurora	
BISON	SesVanderhave	
RADAR	Strube	
VERDI	SesVanderhave	
ZEPHYR	AuroraLionseed	
SHANNON	Aurora	
TUCANO	SesVanderhave	
AARON	AuroraLionseed	

CIPOLLA: pre-semina

ELATERIDI: si consiglia di effettuare controlli per verificare la presenza delle larve interrando nella vicinanza dei fossi, delle testate, un numero minimo di 4 vasi trappola (distanti 2 metri l'uno dall'altro) per appezzamenti fino ad un ettaro, 6 vasi trappola da 2 a 5 ettari, 12 vasi trappola da 6 a 20 ettari, 18 vasi trappola da 21 a 50 ettari. Alla presenza accertata impiegare, in localizzazione, **clorpirifos**.

Diserbo di pre-semina

In caso di infestanti emerse, sono autorizzati i diserbanti a base di **glifosate** (30,4%) 1,5-3 l/ha e **glufosinate ammonio** 4-7 l/ha (quest'ultimo poco efficace a basse temperature, ma di possibile impiego anche in pre-emergenza)

Diserbo di pre-emergenza

Per controllare le infestanti non ancora emerse utilizzare **pendimetalin** (formulati al 31,7%) 2-3 l/ha oppure la miscela di **pendimetalin** (formulati al 31,7%) 2 l/ha + **cloridazon** (BETOZON 65 DF) 1 kg/ha. In caso di infestanti già nate è possibile utilizzare **glufosinate ammonio** (4-7 l/ha).

PATATA: pre-semina

ELATERIDI: in caso di presenza accertata con i vasi trappola o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente intervenire in modo localizzato alla semina impiegando: **etoprofos** (MOCAP o ETOPROSIP, 20 kg/ha) o **thiametoxam** (CRUISER) impiegabile in combinazione con altri geodisinfestanti, tra **thiametoxan** e **imidacloprid** al **max 1 tratt./anno** indipendentemente dall'avversità'.

Diserbo di pre-semina

In caso di infestanti emerse, sono autorizzati i diserbanti a base di **glifosate** (30,4%) 1,5-3 l/ha e **glufosinate ammonio** 4-7 l/ha (quest'ultimo poco efficace a basse temperature, ma di possibile impiego anche in pre-emergenza)

Diserbo di pre-emergenza

Dopo l'ultima rincalzatura si possono utilizzare le miscele di **pendimetalin** (formulati al 31,7%) 2-3 l/ha + **metribuzin** (formulati al 35%) 0,4-0,6 l/ha oppure **pendimetalin** (formulati al 31,7%) 2-2,5 l/ha + **aclonifen** (CHALLENGE) 1,5-2 l/ha + **metribuzin** 0,4-0,5 kg/ha oppure **pendimetalin** (formulati al 31,7%) 2-2,5 l/ha + **metazaclor** (BUTISAN S, SULTAN) 1-1,5 l/ha + **aclonifen** (CHALLENGE) 1-1,5 l/ha oppure **pendimetalin** (formulati al 31,7%) 2-2,5 l/ha + **clomazone** (COMMAND 36 CS) 0,3 l/ha + **meribuzin** 0,4-0,5 kg/.

ERBA MEDICA in produzione

Diserbo di post-emergenza

Dove l'anno precedente erano state rilevate infestazioni di *Cuscuta* intervenire solo sulle chiazze infestate con **propizamide** (KERB FLO alla dose di 3-3,5 l/ha) ricordando che la dose massima ammessa per anno è di 3,6 l/ha solo sul 15% della superficie totale e che i migliori risultati si ottengono con trattamenti effettuati in periodi con prolungata umidità del terreno. In presenza di dicotiledoni comuni intervenire con **imazamox** (ALTOREX, TUAREG) alla dose di 0,750 l/ha con possibile ulteriore addizione di **metribuzin** (formulati al 35% di p.a.) alla dose di 0,3-0,5 kg/ha con infestazione prevalente di Veronica.

PISELLO

Diserbo di pre-semina

In caso di infestanti emerse è possibile utilizzare glifosate (formulati al 30,4% di p.a.) alla dose di 1,5-3 l/ha (attenzione alle registrazioni sulla coltura) o glufosinate ammonio (BASTA) alla dose di 4-7 l/ha.

Diserbo di pre-emergenza

Impiegare pendimetalin (prodotti al 31,7%, 1,5-2 l/ha o Stomp Aqua 1-1,5 l/ha) in miscela con aclonifen (CHALLENGE 1,5-2 l/ha) o con clomazone (COMMAND 36 CS 0,2-0,3 l/ha).

PRODUZIONE BIOLOGICA

PESCO

BOLLA: in caso di previsione di piogge o prolungati periodi di bagnatura, se l'intervento è stato eseguito da più di 15 gg, si consiglia di intervenire con **polisolfuro di calcio** 5-7 kg/hl, si consiglia di non effettuare il trattamento con temperature vicine allo zero.

AFIDI: in presenza di fondatrici ed in assenza di predatori, intervenire nella fase di bottone rosa con ROTENONE (ROTENA, 300 ml/hl o ROTENA 43, 450 ml/hl); è fondamentale portare il pH dell'acqua a 6-6,5.

SUSINO

COCCINIGLIE: in caso di presenza di cocciniglie vive sulle piante o di danni riscontrati alla raccolta nello scorso anno, intervenire (sulle cv europee) con **polisolfuro di calcio** 16 kg in 86 l d'acqua (non effettuare il trattamento con temperature vicine allo zero) oppure, **olio minerale** 2,5-3 l/hl. Ridurre la dose a 2 l/hl sulle cino-giapponesi.

MONILIA: in prefioritura impiegare 2-3 kg/hl POLISOLFURO DI CALCIO.

TENTREDINI: si ricorda di installare, nella fase di inizio bottone bianco, le trappole cromotropiche per la cattura degli adulti.

ALBICOCCO

MONILIA: intervenire in prefioritura con **polisolfuro di calcio** 7 kg/hl, non effettuare il trattamento con temperature vicine allo zero.

PERO

TICCHIOLATURA: in caso di previsione di pioggia, intervenire con **poltiglia bordolese** (formulati al 20%, 500 g/hl) addizionata a 200 g/hl di **zolfo** oppure **polisolfuro di calcio** alla dose di 1,5 kg/hl.

MELO

TICCHIOLATURA: intervenire, in previsione di pioggia, con **poltiglia bordolese** (formulati al 20%, 500 g/hl) addizionata a 200 g/hl di **zolfo**. Si ricorda che l'impiego del **polisolfuro di calcio** alla dose di 1,5 kg/hl ha attività nei confronti della ticchiolatura.

PROSSIMI INCONTRI

Il prossimo incontro di Produzione Integrata avrà luogo **mercoledì 31 marzo 2010** alle **ore 15.00** presso la consueta sede di Dinamica - Villa San Martino.