




Programma
di Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2007/2013

PROVINCIA DI RAVENNA

Bollettino di Produzione Integrata e Biologica

Riportiamo l'aggiornamento della situazione della profondità di falda in tre località della provincia di Ravenna al 15 giugno.



Le aree di Lugo e Santerno stanno iniziando il percorso discendente della profondità di falda, mentre il punto di rilievo dell'area di Alfonsine è da 9 mesi stabilmente sotto i 3 metri di profondità. La differenza di profondità di falda rispetto al pari periodo del 2011 varia da 50 a 125 centimetri. Siccome la falda è inferiore ai 2 metri di profondità il suo contributo per la vita delle piante coltivate è pressoché nullo.

N.B. E' possibile consultare i dati regionali di falda aggiornati al seguente indirizzo web:

irrigation.altavia.eu/servizi/cer/mappafaldacer.aspx

BOLLETTINO IRRIGAZIONE

Elaborazione del 11/06/2012

- **Fragola** Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet ET: 3,4
- **Melone** Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet ET: 4,5
- **Cocomero** Irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet ET: 5
- **Aglione** In caso di precipitazioni inferiori a 20 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3
- **Cipolla** In caso di precipitazioni inferiori a 20 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3
- **Patata** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- **Bietola da seme** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,4
- **Bietola da zucchero** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,5
- **Mais** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,7
- **Pomodoro** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4,4
- **Erba medica** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- **Prato stabile** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 4
- **Fagiolino** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3,5
- **Soia** In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm, irrigare in tutti i terreni con i volumi irrigui riportati nel Disciplinare, oppure indicati nella pagina di risposta del servizio Irrinet. ET: 3

-Arboree In caso di precipitazioni inferiori a 30 mm irrigare restituendo i seguenti volumi giornalieri.

| COLTURA | INTERFILARE INERBITO | INTERFILARE LAVORATO | NOTE |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| POMACEE | 4.2 | - | |
| ALBICOCCO-SUSINO | 3.5 | 2.5 | |
| CILIEGIO | 4.1 | 2.5 | |
| PESCO | 3.5 | 2.5 | |
| VITE | - | - | Non irrigare |
| ACTINIDIA | 4.4 | 3.8 | |

Nella vite e negli arboreti, in caso di piogge inferiori a 20 mm, limitatamente a zone collinari e ai terreni sciolti, è possibile effettuare un intervento di soccorso negli impianti giovani.

In caso di pioggia, per determinare il periodo di sospensione dell'irrigazione, occorre dividere i mm letti con il pluviometro per il consumo giornaliero della coltura interessata. Esempio: una pioggia di 35 mm su susino con interfilare inerbito determinerà un periodo di sospensione dell'irrigazione pari a 10 giorni (35/3.5)

Livello PO al punto di prelievo del CER - Bondeno Loc. Salvatonica (FE)

| Data | Livello | Note |
|-----------|-----------|------|
| 11.6.2012 | mslm 5,28 | |

Si ricorda che l'irrigazione post-trapianto è sempre consentita.

I Consumi medi giornalieri delle colture (ET) si intendono sempre espressi in mm/giorno.