

Bollettino straordinario per la difesa del frumento dal Fusarium:


In considerazione del fatto che:

- 1) La coltura ha raggiunto mediamente lo stadio di spigatura e in alcune varietà è all'inizio della fioritura;
- 2) Il modello previsionale in uso da parte della Regione Emilia-Romagna è a livello di rischio a 7 giorni è MEDIO , ma in risalita nelle aree litoranee e vicino al Po.
- 3) le previsioni meteorologiche valutano una serie di giornate caratterizzate da forti nebbie ed umidità elevata (condizioni meteorologiche favorevoli alla malattia).

Si autorizza di intervenire contro la fusariosi, a partire dal le varietà in spigatura-fioritura , secondo le modalità riportate nei disciplinari di produzione integrata.

Frumento, Fusariosi [FHB-Wheat - © Horta S.r.l.]

Infezione a 7 giorni (n.): data 07/05/2015



Infezione a 7 giorni (n.) data 07/05/2015	
	0,39 n. - 0,76 n.
	0,76 n. - 1,13 n.
	1,13 n. - 1,50 n.
	1,50 n. - 1,88 n.
	1,88 n. - 2,25 n.
	2,25 n. - 2,62 n.
	2,62 n. - 3,00 n.
	3,00 n. - 3,37 n.